

H29年度産 ラッキョウ病害虫防除暦及び農薬注文書

(株) KODANI きっぺい

TEL 0857 (24) 6121

住所 鳥取市福部町

氏名

電話番号

防除時期	薬剤名	薬液の作り方 (水100%当たり薬量)	10アール当たり散布量 及び主な病害虫	注意事項
7/月上旬 }	デイトラベックス油剤		30~40%根腐病 黒腐菌核病	最低15cmの深さに注入する。
7月下旬	バスアミド微粒剤		30kg・根腐病	土壌水分に留意し、均一に混和する。
7月下旬~ 8月下旬 (植付前)	スポルタック乳剤 300倍	333ml	乾腐病	30分間の浸漬時間を厳守する。
植付時	ネマトリンエース粒剤		15kg・ネダニ	植付前、植溝土壌混和
8月下旬~10月下旬	ビリーブ水和剤 1500倍	67g	100~150% ネギハモグリバエ	
	アルバリン顆粒水溶剤 2000倍	50g	100~150% アザミウマ類	
11月5日頃	フロンサイド水和剤 1000倍	100g	100~150% 白色疫病	※20~25日間隔でローテーション防除
11月30日頃	ランマンフロアブル 2000倍	100g		※茎葉にむらなく散布する。
12月25日頃	フォリオゴールド 1000倍	100g		※同じ薬剤(成分)は連用しない。
1月15日頃	ホライズンドライフロアブル 1000倍	100g		※正月明けの天候によっては、フォリオゴールド
	ベトファイター顆粒水和剤 2000倍	50g		もしくはホライズンドライフロアブルを追加防除
2月10日頃	フォリオゴールド 1000倍	100g		する。強風や飛砂で葉傷みはZボルドー
3月 5日頃	フロンサイド水和剤 1000倍	100g	500倍散布	
3月20日頃	ロブラール水和剤 1000倍	100g	150~300% 灰色かび病	※10~15日間隔でローテーション防除
4月5日頃	カンタスドライフロアブル 1500倍	67g		※薬液が株元まで入るように噴霧圧力を確保する
4月15日まで	ロブラール水和剤 1000倍	100g		※同じ薬剤(成分)は連用しない。
4月25日まで	フロンサイド水和剤 2000倍	50g		※収穫時期が近いので使用時期に留意し
5月10日まで	カンタスドライフロアブル 1500倍	67g		降雨等が予想されるときは早めに防除する
4月25日まで	ダントツ粒剤	6kg	6kg・ネギアザミウマ	※収穫時期が近いので使用時期に留意する。
4月上旬~5月10日	アルバリン顆粒水溶剤 2000倍	50g	200~300% アザミウマ類	

薬剤名	規格	注文数
スポルタック乳剤	500ml	
フォリオゴールド	500ml	
ベトファイター顆粒水和剤	500g	
フロンサイド水和剤	500g	
ホライズンドライフロアブル	200g	
ランマンフロアブル	500ml	
ネマトリンエース粒剤	10kg	
モスピラン顆粒水溶剤	250g	
アルバリン顆粒水溶剤	500g	
ダントツ粒剤	3kg	
ダントツ粒剤	10kg	
ビリーブ水和剤	500g	
アグロスリン乳剤	500ml	
スミチオン乳剤	500ml	
スピノエース顆粒水和剤	100g	
トレファノサイド乳剤	500ml	
トレファノサイド乳剤	2L	
トレファノサイド粒剤	3kg	
トレファノサイド粒剤	10kg	
バサグラン液剤	500ml	
ロロックス水和剤	300g	
ミックスパワー乳剤	500ml	
ニーズ乳剤	500ml	
アプローチBI乳剤	500ml	
アビオンE	1L	
アビオンE	5L	
ササラ	500ml	
ササラ	5L	

薬剤名	規格	注文数
スポルタック乳剤	500ml	
フォリオゴールド	500ml	
ベトファイター顆粒水和剤	500g	
フロンサイド水和剤	500g	
ホライズンドライフロアブル	200g	
ランマンフロアブル	500ml	
ネマトリンエース粒剤	10kg	
モスピラン顆粒水溶剤	250g	
アルバリン顆粒水溶剤	500g	
ダントツ粒剤	3kg	
ダントツ粒剤	10kg	
ビリーブ水和剤	500g	
アグロスリン乳剤	500ml	
スミチオン乳剤	500ml	
スピノエース顆粒水和剤	100g	
トレファノサイド乳剤	500ml	
トレファノサイド乳剤	2L	
トレファノサイド粒剤	3kg	
トレファノサイド粒剤	10kg	
バサグラン液剤	500ml	
ロロックス水和剤	300g	
ミックスパワー乳剤	500ml	
ニーズ乳剤	500ml	
アプローチBI乳剤	500ml	
アビオンE	1L	
アビオンE	5L	
ササラ	500ml	
ササラ	5L	

切
取
線